

HOOFD-HALS TUMOREN

Carboplatin – Cetuximab

Schema

- Cetuximab 400 mg/m² laaddosis gevolgd door 250 mg/m²
 - Cyclus 1: infusie over 2u in 250mL NaCl 0.9%, cyclus 2 en verder: infusie over 1u
- Carboplatin AUC 2 IV (infusie over 1 uur in 250mL glucose 5%)
 - Maximale dosis 300mg (maximale klaring 125 mL/min)
- q1w
- Supportieve medicatie
 - Cetirizine 10mg PO 1 uur voor cetuximab
 - Akynzeo 300/0.5mg PO 1 uur voor chemotherapie
 - Dexamethasone 10mg IV

Opmerkingen

- Steeds profylactisch metronidazole crème en minocycline 100mg per dag starten
- Conservatieve maatregelen: zonnebescherming, wassen met lauw water en doucheolie, hydraterende crème.
- Bij huidtoxiciteit:
 - Cefuroxime 500mg 2dd. Voor *S. aureus* surinfectie.
 - Jeuk: cetirizine
 - Xerose: vochtinbrengende crème
 - Eczeem: zwakke topische steroïden
 - Fissuren: Propyleenglycol 50% in water, 30 minuten onder occlusie, 4dd., Salicylzuur 10% 4dd.
 - Paronychia: antiseptische badjes, sterke corticoïden, antiseptica en antifungale middelen 2dd.
- Acneiforme rash: Minocycline verhogen naar 200mg, metronidazole crème tot 5dd.,

Nevenwerkingen

- Gastrointestinaal: nausea, braken, abdominale pijn
- Hematologisch: neutropenie, trombopenie, anemie
- Haarverlies, vermoeidheid, pijn
- Stijging van leverenzymen, nierfunctie-achteruitgang
- Biochemisch: daling serum calcium / magnesium / kalium / natrium
- Infusie-gerelateerde reactie, hypersensitiviteit
- Acneiforme huidrash, paronychia, hypertrichosis, teleangiectasia
- Hypomagnesiëmie (cave orale substitutie niet zinvol, enkel IV)