

DIGESTIEVE ONCOLOGIE

Nal-irinotecan – 5FU

Schema

- Irinotecan nanoliposomaal (Onivyde) 70 mg/m² IV d1 (infusie over 90min in 500mL NaCl 0.9%)
- Levofolinezuur 200 mg/m² IV d1 (infusie over 15min in 100mL glucose 5% - na toediening irinotecan)
- Fluorouracil infusor 2400 mg/m² IV over 48u (in 120mL NaCl 0.9%)
- q2w
- Supportieve medicatie:
 - Palonosetron 250µg IV d1 (30 min voor chemo)
 - Dexamethasone 10mg IV d1 (30 min voor chemo)
 - Dexamethasone 8mg PO d2 + d3
 - Atropine 0.25 mg SC d1 (5 min voor toediening irinotecan nanoliposomaal ter preventie van acuut cholinerg syndroom)

Opmerkingen

- DPD deficiëntie nagaan (zie SOP voor dosisaanpassing)
- UGT1A1 deficiëntie nagaan

Nevenwerkingen

- Gastro-intestinaal: mucositis, nausea, braken, anorexie, diarree
- Alopecie, mucositis
- Hematologisch: neutropenie, trombopenie, anemie
- Cardiovasculair: coronaire spasmen (5FU)

Dosisaanpassingen

- Beperking leverfunctie
 - Als bilirubine > 5mg/dL: geen 5-FU
 - Als bilirubine > 2mg/dL: geen ironotecan nanoliposomaal