

DIGESTIEVE ONCOLOGIE

Paclitaxel +/- Ramucirumab

Schema

- Ramucirumab 8 mg/kg IV d1 + d15 (infusie over 1u in 250mL NaCl 0.9%)
- Paclitaxel 80 mg/m² IV d1 + d8 + d15 (infusie over 1u in 250mL glucose 5%)
- q4w
- Supportieve medicatie
 - Cetirizine 10mg PO d1 + d8 + d15 (1u voor chemo)
 - Dexamethasone 10mg IV d1 + d8 + d15 (30 min voor chemo)

Opmerkingen

- Indien paclitaxel q3w: 175 mg/m² over 3u
- Hilotherapie bevragen
- Ramucirumab geeft vertraagde wondheling
 - Stop 4-6w voor majeure chirurgie
 - Stop 1w voor kleinere chirurgie (vb. PAC plaatsing)
- Controle parameters en urine dipstick voor proteïnurie voor elke toediening ramucirumab

Nevenwerkingen

- Paclitaxel-gerelateerde nevenwerkingen:
 - Gastrointestinaal: nausea, braken, verminderde eetlust, mucositis, diarree
 - Hematologisch: neutropenie, trombopenie, anemie
 - Neurotoxiciteit, vloeistofretentie, vermoeidheid, tranende ogen, nageltoxiciteit
 - Haarverlies
 - Hoofdpijn, spierpijn
- Ramucirumab-gerelateerde bijwerkingen:
 - Hypertensie, proteïnurie, vertraagde wondheling
 - Arteriële thrombose, bloeding

Dosisaanpassingen

- Leverinsufficiëntie
 - Als bilirubine 1.5- 2 ULN: 25% reductie paclitaxel
 - Als bilirubine 2 – 5 ULN: 50% reductie paclitaxel
 - Als bilirubine > 5 ULN: geen paclitaxel.