

DIGESTIEVE ONCOLOGIE

Panitumumab

Schema

- Panitumumab 6 mg/kg q2w (infusie over 30 min in 100mL NaCl 0.9%)
 - Eerste infusie over 60 min
- Geen premedicatie

Opmerkingen

- Steeds profylactisch metronidazole crème en minocycline 100mg per dag starten
- Conservatieve maatregelen: zonnebescherming, wassen met lauw water en doucheolie, hydraterende crème.
- Bij huidtoxiciteit:
 - Cefuroxime 500mg 2dd. Voor S. aureus surinfectie.
 - Jeuk: cetirizine
 - Xerose: vochtinbrengende crème
 - Eczeem: zwakke topische steroïden
 - Fissuren: Propyleenglycol 50% in water, 30 minuten onder occlusie, 4dd., Salicylzuur 10% 4dd.
 - Paronychia: antiseptische badjes, sterke corticoïden, antiseptica en antifungale middelen 2dd.
 - Acneiforme rash: Minocycline verhogen naar 200mg, metronidazole crème tot 5dd.
- Bloeddruk opvolgen

Nevenwerkingen

- Acneiforme huidrash, paronychia, hypertrichosis, teleangiectasia
- Hypomagnesiemia (cave orale substitutie niet zinvol, enkel IV)