

THORAXONCOLOGIE

Afatinib

Schema

- Afatinib 40 mg 1x/d PO continu (voorkeur voor start aan 30 mg/dag gezien toxiciteit)

Opmerkingen

- Nuchtere inname: 3u na of 1u vóór de maaltijd met groot glas water, gemiste dosis kan ingehaald worden tot 8u voor volgende inname.
- Capsules van 20 mg, 30 mg en 40 mg

Nevenwerkingen

- Algemeen: vermoeidheid, koorts, rillingen
- Gastro-intestinaal: vooral diarree en stomatitis, daarnaast anorexie, dyspepsie; soms pancreatitis
- Cardiovasculair: zeldzaam hartfalen
- Neurologisch: dysgeusie
- Pulmonaal: dyspnoe, hoesten, epistaxis, zeldzaam pneumonitis
- Dermatologisch: frequent droge huid, jeuk en acneïforme huiduitslag, lipontsteking; haarverlies mogelijk
- Hepatologisch: stijging leverenzymen
- Hematologische toxiciteit
- Overige: frequent paronychia (nagelafwijkingen), oogafwijkingen (keratitis en conjunctivitis)

Aandachtspunten

- Bij slikproblemen: de tablet (ongebroken) dispergeren in ca. 100 ml niet-koolzuurhoudend water, gedurende 15 min af en toe roeren; dit direct opdrinken en het glas naspoelen met nogmaals 100 ml water en ook dit opdrinken.
- Interactie met pgp-remmers: inname maximaal spreiden over de dag