

THORAXONCOLOGIE

Alectinib

Schema

- Alectinib 600 mg 2x/dag PO continu

Opmerkingen

- Inname bij de maaltijd. Een gemiste dosis mag ingehaald worden tot 6 uur voor het volgende inname-moment. In geval van braken: dosis niet inhalen.
- Capsules van 150 mg

Nevenwerkingen

- Algemeen: vermoeidheid, perifeer oedeem, gewichtstoename
- Gastro-intestinaal: misselijkheid, braken, diarree, obstipatie, anorexie, stomatitis
- Cardiovasculair: ernstige QTc-verlenging, bradycardie
- Pulmonaal: hoest, dyspnoe; zeldzaam pneumonitis
- Neurologisch: dysgeusie, hoofdpijn, duizeligheid, perifere neuropathie
- Musculoskeletaal: stijging CK-enzyme, spierpijn
- Nefrologisch: stijging van het serumcreatinine, hyperuricemie
- Dermatologisch: droge huid, jeuk, huiduitslag.
- Hepatologisch: stijging leverenzymen, zelden pancreatitis
- Hematologische toxiciteit
- Andere: visusstoornissen (meestal in de eerste week), overgevoeligheid voor licht

Aandachtspunten

- Bij ernstige leverfunctiestoornis: aanvangsdosis 450 mg 2x/dag
- Mogelijke dosisreducties: 450 mg 2x/dag -> 300 mg 2x/dag -> stop