

THORAXONCOLOGIE

Atezolizumab

Schema

- Atezolizumab 840mg IV q2w (infusie over 30 min in 250mL NaCl 0.9%)
- Atezolizumab 1200mg IV q3w (infusie over 30 min in 250mL NaCl 0.9%)
- Atezolizumab 1680mg IV q4w (infusie over 30 min in 250mL NaCl 0.9%)
 - Eerste toediening over 60 min
- Atezolizumab 1875g fix subcutaan q3w

Opmerkingen

- Immunotherapie startbilan te doen voor start
- TSH elke keer opvolgen

Nevenwerkingen

- Auto-immune toxiciteit.: kan ontstaan op elk tijdstip (meestal de eerste zes maanden)
- Vermoeidheid, jeuk, rash, thyroiditis, hypothyroidie, diabetes mellitus type 1, hypofysitis, hepatitis, colitis, gastritis, nefritis, pneumonitis, myocarditis
- Verminderde eetlust, nausea, gewichtsverlies
- Elke mogelijke andere auto-immuunreactie is mogelijk, incl. nieuw ontstaan of verergeren van onderliggende auto-immuunziekten (reumatologisch, systeemziekten, neurologisch, endocrinologisch etc)

Dosisaanpassingen

- Immuungerelateerde nevenwerkingen ([Introduction BSMO ImmunoManager - BSMO](#))

Belangrijke medicamenteuze interacties

- Systemische corticoiden of immunosuppressiva kunnen de werkzaamheid verminderen