

THORAXONCOLOGIE

Carboplatine – Etoposide – Durvalumab

Schema

- Durvalumab 1500mg IV (infusie over 60 min in 100mL NaCl 0.9%)
- Carboplatine AUC 5 IV d1 (infusie over 1 uur in 250mL glucose 5%)
 - Maximale dosis 750mg (maximale klaring 125 mL/min)
- Etoposide 100 mg/m² IV d1 + d2 + d3 (infusie over 1 uur in 500mL glucose 5%)
- q3w
- Supportieve medicatie:
 - Akynzeo 300/0.5mg PO op d1 (1u voor chemo)
 - Dexamethasone 10mg IV bolus op d1 + d2 + d3
 - Pegfilgrastim 6mg SC 24u na einde chemotherapie

Opmerkingen

- Immunotherapie startbilan te doen voor start
- TSH elke keer opvolgen

Nevenwerkingen

- Gastrointestinaal: nausea, braken, abdominale pijn, anorexie, diarree
- Hematologisch: neutropenie, thrombopenie, anemie
- Haarverlies, vermoeidheid, pijn
- Stijging van leverenzymes, nierfunctie-achteruitgang
- Biochemisch: daling serum calcium / magnesium / kalium / natrium
- Infusie-gerelateerde reactie, hypersensitiviteit
- Auto-immune toxiciteit

Dosisaanpassingen

- Beperking leverfunctie:
 - Bilirubine 1,5 – 3 mg/dL: 50% reductie etoposide
 - Bilirubine > 3 mg/dL: geen etoposide
- Immuungerelateerde nevenwerkingen ([Introduction BSMO ImmunoManager - BSMO](#))