

THORAXONCOLOGIE

Crizotinib

Schema

- Crizotinib 250 mg 2x/d PO continu

Opmerkingen

- Inname met of zonder voedsel. Vergeten dosis mag tot 6 u voor volgend inname-moment ingehaald worden.
- Capsules van 250 mg en 200 mg

Nevenwerkingen

- Algemeen: vermoeidheid, koorts, koude rillingen, asthenie, perifeer oedeem, griepig gevoel
- Gastro-intestinaal: misselijkheid, braken, diarree, obstipatie, anorexie, abdominale pijn
- Hematologische toxiciteit
- Cardiovasculair: ernstige QTc-verlenging, bradycardie
- Pulmonaal: nasofaryngitis, hoest
- Neurologisch: hoofdpijn, duizeligheid, smaakstoornissen, perifere neuropathie, paresthesieën
- Oftalmologisch: frequent visusstoornissen (vooral in de eerste week),
- Musculoskeletaal: artralgieën, myalgie, spierspasmen, pijn in ledemaat
- Dermatologisch: droge huid, jeuk, erytheem, huiduitslag.
- Hepatologisch: stijging leverenzymen
- Nefrologisch: stijging creatinine

Aandachtspunten

- Dosisreductie: 250 mg 2x/dag -> 200 mg 2x/dag -> 250 mg 1x/dag -> stop