

THORAXONCOLOGIE

Entrectinib

Schema

- Entrectinib 600 mg 1x/d PO continu

Opmerkingen

- Inname met of zonder voedsel.
- Gemiste dosis kan ingehaald worden tot 12u voor volgend innamemoment. In geval van braken kan de dosis herhaald worden.
- Capsules van 100 en 200 mg

Nevenwerkingen

- Algemeen: vermoeidheid, koorts, koude rillingen, asthenie, perifeer oedeem
- Hematologisch: anemie, neutropenie
- Gastro-intestinaal: misselijkheid, braken, diarree, obstipatie, anorexie, abdominale pijn
- Cardiovasculair: hypertensie, bloedingen (waaronder intracraniele bloedingen en fatale bloedingen)
- Pulmonaal: nasofaryngitis, hoest
- Neurologisch: hoofdpijn, duizeligheid, perifere neuropathie, ataxie, dysesthesie, cognitieve dysfunctie
- Oftalmologisch: visusstoornissen
- Musculoskeetaal: artralgie, myalgie, spierspasmen, pijn in ledemaat
- Dermatologisch: droge huid, jeuk, huiduitslag.
- Hepatologisch: stijging leverenzymen

Aandachtspunten

- Dosisreductie: 600 mg 1x/dag -> 400 mg 1x/dag -> 200 mg 1x/dag -> stop