

THORAXONCOLOGIE

Lorlatinib

Schema

- Lorlatinib 100 mg 1x/d PO continu

Opmerkingen

- Inname met of zonder voedsel. Gemiste dosis mag tot 4u voor volgende inname moment ingenomen worden.
- Capsules van 100 mg en 25 mg

Nevenwerkingen

- Algemeen: vermoeidheid, koorts, asthenie, perifeer oedeem, gewichtstoename
- Gastro-intestinaal: misselijkheid, braken, diarree, obstipatie, anorexie, stomatitis, dyspepsie, flatulentie
- Cardiovasculair: AV-blok, hypertensie, bradycardie, hartfalen
- Pulmonaal: hoest, dyspnoe, pneumonitis
- Neurologisch: hoofdpijn, duizeligheid, perifere neuropathie, cognitieve effecten, abnormale spraak, wisselende stemming; zeldzaam psychose
- Oftalmologisch: visusstoornissen
- Musculoskeletaal: spierpijn, gewrichtspijn
- Dermatologisch: droge huid, jeuk, erytheem, huiduitslag.
- Hepatologisch: stijging leverenzymen, stijging pancreasenzymen
- Hematologische toxiciteit
- Andere: hyperlipidemie, onaangenaam gevoel op de borst

Dosisreductie

- 100 mg 1x/dag -> 75 mg 1x/dag -> 50 mg 1x/dag -> stop