

THORAXONCOLOGIE

Pemetrexed + Pembrolizumab

Schema

- Pemetrexed 500 mg/m² IV q3w (infusie over 10 min in 100 mL NaCl 0.9%)
- Pembrolizumab IV 200 mg q3w (infusie over 30 min in 100 mL NaCl 0.9%)
- q3w
- Supportieve medicatie
 - Dexamethasone 10mg IV op d1 (30min voor chemotherapie)
 - Dexamethasone 8mg PO -24h, -12h, 12h, 24h, 48h, 72h

Opmerkingen

- Volg perifere neuropathie op. Zie SOP polyneuropathie.
- Voor chemo te starten met suppletie (zo mogelijk 1 week op voorhand)
 - Foliumzuur 0.4 mg PO 1x/dag. Tot 3 weken na laatste toediening Pemetrexed.
 - Vitamine B12 1000 µg IM 1x/9 weken
- Immunotherapie startbilan te doen voor start
- TSH elke keer opvolgen

Nevenwerkingen

- Algemeen: vermoeidheid, overgevoeligheidsreacties, rhinitis en conjunctivitis
- Gastro-intestinaal: anorexie, diarree, nausea, stomatitis, braken, smaakveranderingen
- Hematologisch: anemie, thrombopenie, neutropenie
- Neurologisch: perifere neuropathie
- Hepatologisch: stijging leverenzymen
- Dermatologisch; huidrash, jeuk
- Nefrologisch: achteruitgang van de nierfunctie
- Infuus gerelateerde nevenwerkingen
- Immuungerelateerde nevenwerkingen ([Introduction BSMO ImmunoManager - BSMO](#))