

THORAXONCOLOGIE

Selpercatinib

Schema

- Selpercatinib 160 mg 2x/dag PO continu (indien ≥ 50 kg)
- Selpercatinib 120 mg 2x/dag PO continu (indien < 50 kg)

Opmerkingen

- Inname met of zonder voedsel. Gemiste dosis niet inhalen, in geval van braken geen extra dosis innemen.
- Capsules van 40 en 80 mg

Nevenwerkingen

- Algemeen: vermoeidheidasthenie, perifeer oedeem, overgevoeligheidsreacties
- Hematologisch: anemie, trombopenie, neutropenie
- Gastro-intestinaal: misselijkheid, braken, diarree, obstipatie, anorexie, abdominale pijn, stomatitis
- Cardiovasculair: verlengd QTc-interval, hypertensie, verhoogd bloedingsrisico,
- Endocrinologisch: hyperglycemie
- Neurologisch: hoofdpijn
- Musculoskeetaal: artralgie, myalgie
- Dermatologisch: huiduitslag.
- Hepatisch: stijging leverenzymes, zelden pancreatitis

Dosisreductie

- > 50 kg: 160 mg 2x/dag -> 120 mg 2x/dag -> 80 mg 2x/dag -> 40 mg 2x/dag -> stop
- < 50 kg: 120 mg 2x/dag -> 80 mg 2x/dag -> 40 mg 2x/dag -> stop