

THORAXONCOLOGIE

Topotecan

Schema

- Topotecan 1.5mg/m² IV op d1 + d2 + d3 + d4 + d5 q3w (infusie over 30 min in 50mL NaCl 0.9%)
OF
- Topotecan 2.3mg/m² PO op d1 + d2 + d3 + d4 + d5 q3w
- Supportieve medicatie bij IV toediening
 - Dexamethasone 10mg IV op d1 + d2 + d3 + d4 + d5

Opmerkingen

- Capsules in de koelkast bewaren
- Zonder te kauwen volledig inslikken zonder te verpulveren of te openen, met of zonder voedsel

Nevenwerkingen

- Algemeen: vermoeidheid, haarverlies, pijn, hypersensitiviteitsreactie
- Gastrointestinaal: anorexie, nausea, braken, diarree, abdominale pijn, constipatie, intestinale obstructie
- Hematologisch: neutropenie, thrombopenie, anemie
- Stijging van de leverenzymen
- Dyspneu, pneumonie

Dosisaanpassingen

- Nierinsufficiëntie:
 - eGFR 45-60 mL/min: reduceer dosis topotecan met 20%
 - eGFR 30-45 mL/min: reduceer dosis topotecan met 25%
 - eGFR <30 mL/min: reduceer dosis topotecan met 30%