

HOOFD-HALS TUMOREN

Cisplatin – Etoposide

Schema

- Cisplatin 80 mg/m² IV op d1 (infusie over 1 uur in 500mL NaCl 0.9%)
- Etoposide 100 mg/m² IV op d1 + d2 + d3 (infusie over 1 uur in 500 ml NaCl 0.9%)
- Q3w
- Prehydratatie d1: 1L NaCl 0.9% IV over 2u voorspoelen en 1L NaCl 0.9% IV over 2u naspoelen
- Supportieve medicatie:
 - Akynzeo 300/0.5mg PO op d1 (1u voor chemotherapie)
 - Dexamethasone 10mg IV bolus op d1 (30 min voor chemotherapie)
 - Dexamethasone 8mg PO op d2 + d3 + d4
 - Olanzapine 5mg PO d1 (1u voor chemotherapie) + d2 + d3 + d4
 - Pegfilgrastim 6mg SC 24u na einde chemotherapie

Opmerkingen

- Audiometrie voor start behandeling
- CAVE IV contrast

Nevenwerkingen

- Neuropathie, ototoxiciteit, nefrotoxiciteit (vermijd NSAID)
- Gastro-intestinaal: nausea, braken, anorexie, mucositis, diarree
- Hematologisch: neutropenie, thrombopenie, anemie
- Haarverlies, vermoeidheid

Dosisaanpassingen

- Beperking nierfunctie:
 - eGFR 45-60 mL/min: reduceer dosis cisplatin met 25%
 - eGFR 30-45 mL/min: reduceer dosis cisplatin met 50%
 - eGFR <30 mL/min: geen cisplatin
- Beperking leverfunctie:
 - Bilirubine 1,5 – 3 mg/dL: reduceer etoposide met 50%
 - Bilirubine > 3 mg/dL: geen etoposide