

DIGESTIEVE ONCOLOGIE

Carboplatinum – Paclitaxel

Schema

- Paclitaxel 80 mg/m² IV q1w op d1 + d8 + d15 (over 60 min in 250mL glucose 5%)
- Carboplatinum AUC 5 IV q3w op d1 (over 60 min in 250mL glucose 5%)
 - Maximale dosis 750mg (maximale klaring 125 mL/min)
- q4w
- Supportieve medicatie:
 - Akynzeo 300/0.5mg PO op d1 (1u voor chemotherapie)
 - Cetirizine 10mg PO op d1 + d8 + d15 (1u voor chemotherapie)
 - Dexamethasone 10 mg IV op d1 + d8 + d15 (30 min voor chemotherapie)

Opmerkingen

- Volg perifere neuropathie op (zie SOP polyneuropathie)

Nevenwerkingen

- Gastrointestinaal: anorexia, nausea, braken, mucositis, diarree
- Hematologisch: neutropenie, trombopenie, anemie
- Neurotoxiciteit, nefrotoxiciteit, vochtretentie, tranende ogen, nagel toxiciteit
- Haarverlies
- Spierpijn, hoofdpijn

Dosisaanpassingen

- Leverinsufficiëntie
 - Als bili 1.5- 2 ULN: 25% reductie paclitaxel
 - Als bili 2 – 5 ULN: 50% reductie paclitaxel
 - Als bili >5: geen paclitaxel