

## NEURO-ONCOLOGIE

### Vorasidenib (VORANIGO®)

#### Schema

- Vorasidenib 40mg 1x/dag continu

#### Opmerkingen

- Vorasidenib is beschikbaar als tabletten van 10 en 40 mg
- Inname op een nuchtere maag, minstens één uur voor of twee uur na een maaltijd. Inname op vast tijdstip.
- Tablet niet breken, pletten of kauwen
- Bij braken na inname van tablet, medicatie niet opnieuw innemen.
- Bij vergeten dosis alleen nog innemen als het minder dan 6 uur is nadat de geplande dosis ingenomen moest worden. Zit er meer dan 6 uur tussen, dan dosis over te slaan en de volgende in te nemen op het geplande tijdstip.
- AYA counseling, inclusief fertiliteit en kinderwens
- Leverfunctie op te volgen om de 2 weken gedurende de eerste 2 maanden; daarna maandelijks

#### Nevenwerkingen

- Algemeen: vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn
- Gastro-intestinaal: hepatotoxisch

#### Dosisaanpassingen

- Beperking leverfunctie
  - Graad 2/3 ALT/AST : stop en wacht tot recuperatie tot graad 1
  - Daarna verder aan gereduceerde dosis:
    - ✓ Eerste dosis reductie : 20 mg 1x/dag
    - ✓ Tweede dosis reductie: 10 mg 1x/dag
    - ✓ Permanent te stoppen indien 10mg niet wordt getolereerd