

DIGESTIEVE ONCOLOGIE

SOX (oxaliplatine - tegafur/gimeracil /oteracil) +/- bevacizumab

Schema

- Tegafur- gimeracil-oteracil 25mg/m² PO 2x/dag d1 tot d14
 - Dosis uitgedrukt in dosis tegafur
- Oxaliplatin 130mg/m² IV d1 (infusie over 2u in 250mL glucose 5%)
- Bevacizumab 7.5 mg/kg IV d1
 - Cyclus 1: infusie over 90 min in 100 mL NaCl 0.9%
 - Cyclus 2: infusie over 60 min in 100 mL NaCl 0.9%
 - Cyclus 3 en verder: infusie over 30 min in 100 mL NaCl 0.9%
- q3w

Opmerkingen

- Tabletten van **20mg/5.8mg/15.8mg** en **15mg/4.35mg/11.8mg**
- Te nemen op een lege maag, 1u voor of 1u na de maaltijd
- Bij vergeten dosis, alsnog zo snel mogelijk dosis te nemen.
- Bij braken, geen nieuwe dosis te nemen.
- Steeds DPD-status na te gaan voor start therapie.
- Contact met koude vermijden de eerste 3 dagen

Nevenwerkingen

- Algemeen: vermoeidheid, asthenie
- Gastro-intestinaal: nausea/braken, diarree/constipatie, orale mucositis, anorexie
- Hematologisch: neutropenie, thrombocytopenie, anemie
- Neurologisch: perifere neuropathie, laryngo-pharyngeale dysesthesie
- Huidtoxiciteit (palmar-plantair erythrodysesthesiesyndroom) kan, (partiële) alopecie
- Zie schema bevacizumab voor bevacizumab specifieke nevenwerkingen

Dosisaanpassingen

- Acute laryngo-pharyngeale dysesthesie: geef oxaliplatin over 4 – 6u
- Beperking nierfunctie:
 - Klaring 30 – 49 mL/min: 25% reductie oxaliplatin + start Teysuno 1 dosislevel lager

Teysono dosislevels	
Start dosis	25mg/m ²
1 ^e dosisreductie	20mg/m ²