

## DIGESTIEVE ONCOLOGIE

### Tegafur - Gimeracil - Oteracil (Tegsuno® / S-1)

#### Schema

- Tegafur- gimeracil-oteracil 30mg/m<sup>2</sup> PO 2x/d van d1 tot en met d14
  - Dosis uitgedrukt in dosis tegafur
- q3w

#### Opmerkingen

- Tabletten van 20mg/5.8mg/15.8mg en 15mg/4.35mg/11.8mg
- Te nemen op een lege maag, 1u voor of 1u na de maaltijd
- Bij vergeten dosis, alsnog zo snel mogelijk dosis te nemen.
- Bij braken, geen nieuwe dosis te nemen.
- Steeds DPD-status na te gaan voor start therapie.

#### Nevenwerkingen

- Algemeen: perifere neuropathie, vermoeidheid, asthenie
- Gastro-intestinaal: nausea/braken, diarree/constipatie, orale mucositis, anorexie
- Hematologisch: neutropenie, trombocytopenie, anemie
- Huidtoxiciteit (palmar-plantair erythrodysesthesiesyndroom) kan, (partiële) alopecie

#### Dosisaanpassingen

- Beperking nierfunctie:
  - Klaring 30 – 49 mL/min: start aan 1 dosislevel lager

| Tegsuno dosislevels          |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Start dosis                  | 30mg/m <sup>2</sup> |
| 1 <sup>e</sup> dosisreductie | 25mg/m <sup>2</sup> |
| 2 <sup>e</sup> dosisreductie | 20mg/m <sup>2</sup> |