

GENITO-URINAIRE TUMOREN

Enfortumab vedotin

Schema

- Enfortumab vedotin 1,25 mg/kg IV op d1 + d8 + d15 (infusie over 30 min in 100mL NaCl 0.9%)
 - Maximale dosis 125mg
- q4w
- Supportieve medicatie
 - Dexamethasone 10mg IV op d1 + d8 + d15

Opmerkingen

- Preventief kunsttranen voorschrijven.
- Bij wazig zicht of droge ogen: kunsttranen 4x/d (Hylo Dual ®) en kunstzalf (Hylo Night ®)
- Bij nausea: olanzapine 2.5mg 's avonds
- Steeds onderzoeken / bevragen: polyneuropathie, huidtoxiciteit, interstitieel longlijden. Cave SJS.

Nevenwerkingen

- Dermatologisch: **huiduitslag**, haarverdunding, jeuk. Zeer zelden Stevens-Johnson syndroom.
- Endocrien en metabolisch: **hyperglycemie**, hypofosfatemie- en kaliëmie, gewichtsverlies
- Gastro-intestinaal: constipatie, abdominale pijn, anorexie, nausea, braken, diarree, smaakveranderingen, verhoogd serumlipase
- Pneumologisch: **interstitieel longlijden**
- Hematologisch: anemie, neutropenie, bloeding
- Stijging AST, stijging creatinine, musculoskeletale pijn
- Zenuwstelsel: **perifere neuropathie**, vermoeidheid,
- Oftalmologisch: **droge ogen**, wazig zicht, tranen

Dosisaanpassingen

- Leverfunctiestoornissen:
 - Matig tot ernstig (bilirubine > 1 - 1.5 x ULN of AST > ULN): geen enfortumab vedotin
- Dosislevels: 1.25 mg/kg -> 1 mg/kg -> 0.75 mg/kg -> 0.5 mg/kg