

THORAXONCOLOGIE

HITHOC (hyperthermic intrathoracic chemotherapy): cisplatin en epirubicine

Schema

- Cisplatin 80 mg/m² intrathoracaal d1 (infusie over 60 min in spoelvloeistof aan 2L/m²)
- Epirubicine 25 mg/m² intrathoracaal d1 (infusie over 60 min in spoelvloeistof aan 2L/m²)
- Eénmalige toediening aan 41-42°C op het operatiekwartier
- Anti-emetica volgens OK schema anesthesist

Aandachtspunten

- Het operatiekwartier belt naar apotheek als de intrathoracale chemotherapie mag klaargemaakt worden: binnen het uur zal de chemotherapie klaar zijn
- Cisplatine en epirubicine worden in Equashieldspuiten per +/-50ml bereid + equashield Luer lock connectors worden meegegeven
- Audiometrie voor start behandeling

Voorwaarden

- Goede performance status (WHO 0-1)
- Geen significante comorbiditeiten
- Goede nierfunctie: creatinine < 55µmol/L
- Tumor beperkt tot ipsilaterale hemothorax

Nevenwerkingen

- Neuropathie, ototoxiciteit, nefrotoxiciteit (vermijd NSAID)
- Gastro-intestinaal: nausea, braken, anorexie, mucositis, diarree
- Hematologisch: neutropenie, trombopenie, anemie
- Haarverlies, vermoeidheid

Opstelling

