

HOOFD-HALS TUMOREN

Carboplatin – Paclitaxel

Schema

- Paclitaxel 175mg/m² IV (infusie over 3 uur in 500mL glucose 5%)
- Carboplatin AUC 6 IV (infusie over 1 uur in 250mL glucose 5%)
 - Maximale dosis 900mg (maximale klaring 125 mL/min)
- q3w
- Supportieve medicatie
 - Cetirizine 10mg PO
 - Akynzeo 300/0.5mg PO (alternatief Aloxi 250µg IV indien patiënt niet kan slikken én geen PEG of microsonde heeft)
 - Dexamethasone 20mg IV 1u voor paclitaxel

Nevenwerkingen

- Gastrointestinaal: anorexia, nausea, braken, mucositis, diarree
- Hematologisch: neutropenie, trombopenie, anemie
- Neurotoxiciteit, nefrotoxiciteit, vochtretentie, tranende ogen, nagel toxiciteit
- Haarverlies
- Spierpijn, hoofdpijn

Dosisaanpassingen

- Leverinsufficiëntie
 - Als bili 1.5- 2 ULN: 25% reductie paclitaxel
 - Als bili 2 – 5 ULN: 50% reductie paclitaxel
 - Als bili >5: geen paclitaxel.