

HOOFD-HALS TUMOREN

Docetaxel – Carboplatin – Fluorouracil

Schema

- Docetaxel 75 mg/m² IV q3w (infusie over 1 uur in 250mL glucose 5%)
- Carboplatin AUC 6 IV q3w (infusie over 1 uur in 250mL glucose 5%)
- 5-FU infusor 3750 mg/m² IV (infusie over 5 dagen in 240 mL NaCl 0.9%)
- Supportieve medicatie
 - Akynzeo 300/0.5mg PO 1 uur voor chemotherapie (alternatief Aloxi 250µg IV indien patiënt niet kan slikken én geen PEG of microsonde heeft)
 - Dexamethasone 20mg IV
 - Pegfilgrastim 6mg SC 24u na einde 5-FU infusor
 - Ciprofloxacin 500mg 2x/d PO d5 – d15 (via thuisapotheek voorschrijven)

Opmerkingen

- DPD deficiëntie nagaan
- Gebruik van koelsysteem handen

Nevenwerkingen

- Neuropathie
- Gastrointestinaal: nausea, braken, abdominale pijn
- Hematologisch: neutropenie, trombopenie, anemie
- Haaruitval, vermoeidheid, vochtretentie, tranende ogen, nageltoxiciteit, pijn
- Stijging van leverenzymen, nierfunctie-achteruitgang
- Cardiovasculair: coronaire spasmen, ECG afwijkingen (5-FU-gerelateerd)
- Biochemisch: daling serum calcium / magnesium / kalium / natrium
- Infusie-gerelateerde reactie, hypersensitiviteit

Dosisaanpassingen

- Leverinsufficiëntie
 - Bilirubine > 5mg/dL: geen 5-FU
 - Bilirubine > ULN: geen docetaxel