

HOOFD-HALS TUMOREN

Carboplatin – Fluorouracil – Pembrolizumab

Schema

- Pembrolizumab 200mg IV (infusie over 30 min in 100mL NaCl 0.9%)
- Carboplatin AUC 5 IV (infusie over 1 uur in 250mL glucose 5%)
 - Maximale dosis 750mg (maximale klaring 125 mL/min)
- 5-FU infusor 4000 mg/m² IV (infusie over 4 dagen in 192 mL NaCl 0.9%)
- q3w
- Supportieve medicatie
 - Akynzeo 300/0.5mg PO 1 uur voor chemotherapie (alternatief Aloxi 250µg IV indien patiënt niet kan slikken én geen PEG of microsonde heeft)
 - Dexamethasone 10mg IV

Opmerkingen

- DPD deficiëntie nagaan
- Immunotherapie startbilan bloedname voor start
- TSH elke keer opvolgen

Nevenwerkingen

- Gastrointestinaal: nausea, braken, abdominale pijn
- Hematologisch: neutropenie, thrombopenie, anemie
- Haarverlies, vermoeidheid, pijn
- Cardiovasculair: coronaire spasmen, ECG afwijkingen (5FU-gerelateerd)
- Stijging van leverenzymen, nierfunctie-achteruitgang
- Biochemisch: daling serum calcium / magnesium / kalium / natrium
- Infusie-gerelateerde reacties, hypersensitiviteit
- Immuuntoxiciteit ([Introduction BSMO ImmunoManager - BSMO](#))

Dosisaanpassingen

- Beperking leverfunctie:
 - Bilirubine > 5mg/dL: geen 5-FU