

HOOFD-HALS TUMOREN

Carboplatin – Fluorouracil met Radiotherapie

Schema

- Carboplatin AUC 4 IV (infusie over 1 uur in 250mL glucose 5%)
 - Maximale dosis 600mg (maximale klaring 125 mL/min)
- 5-FU infusor 2400 mg/m² IV (infusie over 4 dagen in 192 mL NaCl 0.9%)
- q3w zolang radiotherapie loopt
- Supportieve medicatie
 - Akynzeo 300/0.5mg PO 1 uur voor chemotherapie (alternatief Aloxi 250µg IV indien patiënt niet kan slikken én geen PEG of microsonde heeft)
 - Dexamethasone 10mg IV

Opmerkingen

- DPD deficiëntie nagaan
- Streefwaarde Hb 10g/dL gezien radiotherapie

Nevenwerkingen

- Gastrointestinaal: nausea, braken, abdominale pijn
- Hematologisch: neutropenie, thrombopenie, anemie
- Haarverlies, vermoeidheid, pijn
- Cardiovasculair: coronaire spasmen, ECG afwijkingen (5FU-gerelateerd)
- Stijging van leverenzymen, nierfunctie-achteruitgang
- Biochemisch: daling serum calcium / magnesium / kalium / natrium
- Infusie-gerelateerde reactie, hypersensitiviteit

Dosisaanpassingen

- Beperking leverfunctie:
 - Bilirubine > 5mg/dL: geen 5-FU