

HOOFD-HALS TUMOREN

Cisplatin – Fluorouracil – Pembrolizumab

Schema

- Pembrolizumab 200mg (infusie over 30 min in 100mL NaCl 0.9%)
- Cisplatin 100mg/m² IV (infusie over 1 uur in 500mL NaCl 0.9%)
- 5-FU infusor 5000 mg/m² IV (infusie over 5 dagen in 240 mL NaCl 0.9%)
- q3w
- Prehydratatie: 1L NaCl 0.9% IV over 2u voorspoelen en 3x 1L NaCl 0.9% IV over 6u naspoelen (3^e liter optioneel ifv patiëntprofiel)
- Supportieve medicatie
 - Akynzeo 300/0.5mg PO 1 uur voor chemotherapie
 - Dexamethasone 10mg IV
 - Dexamethasone 8mg PO op d2 + d3 + d4
 - Olanzapine 5mg PO op d1 + d2 + d3 + d4
 - Lipegfilgrastim 6mg SC op d6

Opmerkingen

- Toe te dienen via opname
- Audiometrie voor start behandeling
- CAVE IV contrast
- DPD deficiëntie nagaan
- Immunotherapie startbilan bloedname voor start
- TSH elke keer opvolgen

Nevenwerkingen

- Neuropathie, ototoxiciteit, nefrotoxiciteit (vermijd NSAID)
- Gastrointestinaal: nausea, braken
- Hematologisch: neutropenie, thrombopenie, anemie
- Haarverlies, vermoeidheid, stijging van leverenzymen
- Cardiovasculair: coronaire spasmen, ECG afwijkingen (5FU-gerelateerd)
- Infuus gerelateerde nevenwerkingen
- Immuuntoxiciteit ([Introduction BSMO ImmunoManager - BSMO](#))

Dosisaanpassingen

- Nierinsufficiëntie:
 - eGFR 45-60: reduceer dosis cisplatin met 25%
 - eGFR 30-45: reduceer dosis cisplatin met 50%
 - eGFR <30: geen cisplatin
- Leverinsufficiëntie

- Bilirubine > 5mg/dL: geen 5-FU