

HOOFD-HALS TUMOREN

Cisplatin met Radiotherapie

Schema

- Cisplatin 40mg/m² IV (infusie over 1 uur in 250mL NaCl 0.9%)
 - q1w zolang radiotherapie loopt
- Prehydratatie: 1L NaCl 0.9% IV over 2u voorspoelen en 1L NaCl 0.9% IV over 2u naspoelen
- Supportieve medicatie
 - Akynzeo 300/0.5mg PO
 - Dexamethasone 10mg IV
 - Dexamethasone 8mg PO op d2 + d3 + d4

Opmerkingen

- Audiometrie voor start behandeling
- CAVE IV contrast
- Streefwaarde Hb 10g/dL gezien radiotherapie

Nevenwerkingen

- Neuropathie, ototoxiciteit, nefrotoxiciteit (vermijd NSAID)
- Gastrointestinaal: nausea, braken
- Hematologisch: neutropenie, thrombopenie, anemie
- Mild haarverlies, vermoeidheid
- Stijging van leverenzymen

Dosisaanpassingen

- Nierinsufficiëntie:
 - eGFR 45-60: reduceer dosis cisplatin met 25%
 - eGFR 30-45: reduceer dosis cisplatin met 50%
 - eGFR <30: geen cisplatin