

GYNAECOLOGISCHE TUMOREN

Rucaparib (Rubraca)

Schema

- Rucaparib 600mg 2x/dag
 - Te starten max. 8 weken na laatste platinumgebaseerde chemotherapie

Opmerkingen

- Inname met of zonder voedsel
- Tussenperiode van 12 uur tussen innames
- Bij gemiste of uitgebraakte dosis: dosis niet inhalen
- Fototoxiciteit: direct zonlicht vermijden, zonnecrème en lippenbalsem gebruiken

Nevenwerkingen

- Algemeen: vermoeidheid, overgevoeligheid, koorts
- Endocrien: verhoging cholesterol
- Gastro-intestinaal: anorexie, dysgeusie, dyspepsie, nausea, braken, stomatitis, darmobstructie
- Hematologisch: anemie, neutropenie, thrombocytopenie, myelodysplastisch syndroom, acute myeloïde leukemie
- Hepatologisch: verhoogd ALT/AST
- Huid: fototoxiciteit, maculopapuleuze rash, hand-voetsyndroom
- Neurologisch: duizeligheid
- Pulmonaal: dyspnoe
- Renaal: verhoging serumcreatinine

Dosisaanpassingen

- Dosisreducties:
 - Dosisreductie 1: 500mg 2x/dag
 - Dosisreductie 2: 400mg 2x/dag
 - Dosisreductie 3: 300mg 2x/dag